

SCHEMA TECNICA

Sprint

CONCIME UNIVERSALE PELLETTATO 800 G

CODICE: LI10100**CODICE EAN: 8009985017081****CLASSIFICAZIONE:** Concime Organo-minerale NPK 8-5-6**COMPOSIZIONE**

Azoto (N) totale8%
 Azoto (N) organico2,5%
 Azoto (N) ureico5,5%
 Anidride fosforica (P₂O₅) solubile unicamente negli acidi minerali.....5%
 Anidride fosforica (P₂O₅) solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato, solubile nell'acido formico al 2%.....5%
 Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua6%
 Carbonio organico (C) di origine biologica 16%.
Concimi minerali: sali misti potassici, fosfato naturale tenero, urea
Concimi organici: farina di carne, farina di ossa, cuoio e pelli idrolizzati, miscela di concimi organici azotati, miscela di concimi organici NP

CARATTERISTICHE: Sprint Universale, grazie alla sua composizione, risulta essere un formulato di larghissima destinazione d'uso in grado di fornire a ogni tipo di pianta il necessario e giusto apporto nutritivo, garantendo una crescita omogenea e bilanciata. Sprint Universale è il prodotto ideale da utilizzare su orti, aiuole da fiore, cespugli e siepi, piante da frutto, alberi ornamentali e conifere, prati.

FORMULAZIONE: pellet.**CONFEZIONE:** astuccio (PAP21 – carta) – sacchetto (7 -plastica)**PESO NETTO:** 800 g 

USO E DOSI: distribuire il prodotto uniformemente sul terreno o interrare e successivamente innaffiare. Una manciata corrisponde a circa 50 g di prodotto.

- *Aiuole da fiore:* distribuire 30÷40 g/m² (pari a circa 3-4 cucchiaini) a seconda delle specie trattate; successivamente innaffiare. Trattare ogni 15-20 giorni durante tutto il ciclo vegetativo.
- *Orti:* 40÷60 g/m² (pari a circa 4-6 cucchiaini) ogni 15-20 giorni durante tutto il ciclo vegetativo.
- *Piante da frutto:* distribuire 60÷90 g (pari a circa 6-9 cucchiaini) per pianta a seconda delle dimensioni; successivamente innaffiare. Effettuare 3 applicazioni all'anno, una a inizio primavera, una dopo la fioritura e una a fine estate.
- *Cespugli e siepi:* distribuire 40÷60 g (pari a circa 4-6 cucchiaini) per pianta a seconda della dimensione; successivamente innaffiare. Trattare ogni 15-20 giorni da fine inverno a fine estate.
- *Alberi ornamentali e conifere:* distribuire 60÷80 g (pari a circa 6-8 cucchiaini) per pianta a seconda della dimensione; successivamente innaffiare. Effettuare 2 applicazioni all'anno, una a fine inverno, una a fine primavera.
- *Prati:* distribuire 40÷50 g/m² (pari a circa 4-5 cucchiaini) ogni 10-20 giorni da marzo a giugno e in settembre, dopo il taglio e su terreno asciutto; successivamente innaffiare. Sospendere i trattamenti nel periodo più caldo.

EPOCA D'IMPIEGO:

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tutto l'anno.

AVVERTENZE: le dosi riportate hanno valore indicativo in quanto dipendono dalle condizioni ambientali. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Non ingerire. Le istruzioni sono idonee per l'uso indicato. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle