
SCHEDA TECNICA

SPRINT**TRIPLA AZIONE SPRAY PRONTO ALL'USO 500 ML****Insetti – Acari -Malattie****CODICE ARTICOLO:** LI I I 200**CODICE EAN:** 8009985022023

CLASSIFICAZIONE: MISCELA DI SOSTANZE DI BASE Reg. CE I 107/2009. *Urtica spp.* e *Equisetum arvense*
- Reg. UE 2017/419; Reg. UE 462/2014 -

COMPOSIZIONE: estratto di equisetto (*Equisetum arvense*) 0,75% v/v, estratto di ortica (*Urtica dioica*) 0,75% v/v.

FORMULAZIONE: liquido pronto all'uso.

CONFEZIONE: FLACONE HDPE2 -PLASTICA, VAPORIZZATORE 7 – PLASTICA, ETICHETTA PP5 - PLASTICA

CONTENUTO NETTO: 500 ml

COS'E': è un prodotto a base di di equisetto (*Equisetum arvense*) e estratto di ortica (*Urtica dioica*).

AZIONI SVOLTE:

tripla azione contro insetti, acari e malattie.

1. L'estratto di equisetto è ricco di flavonoidi, saponosidi, alcaloidi e silicati sotto forma di silice, sostanze in grado di rinforzare i tessuti delle piante inibendo lo sviluppo di **malattie fungine**, in particolare **mal bianco o oidio, peronospora, ticchiolatura, botrite, bolla del pesco, alternaria e septoria**.
2. Le sostanze urticanti presenti nell'ortica aiutano le piante a proteggersi in presenza di insetti succhiatori, in particolare, **afidi, tripidi e mosche bianche**, e di **acari o ragnetti rossi**.

DOVE SI USA: Il prodotto ha un'azione protettiva nei confronti delle colture orticole e delle frutticole.

L'USO DEL PRODOTTO È CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA AI SENSI DEL REG. UE 2018/848.

DOSI, INDICAZIONI E PRESCRIZIONI D'USO

Da utilizzarsi in accordo con le indicazioni specifiche incluse nei Rapporti del Riesame SANTE/I 1809/2016 e SANCO I2386/2013.

Agitare bene prima dell'uso e nebulizzare la pianta da una distanza di 30 cm, bagnando in modo uniforme tutta la superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie.

Azione preventiva: trattare ogni 10-15gg, dall'inizio della fioritura fino a prima della raccolta dei frutti.

Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l'operazione ogni 7-10 giorni dopo il primo trattamento.

Intervallo di pre-raccolta 7 giorni su tutte le cultura, 15 giorni per cetriolo e pomodoro.

PRECAUZIONI D'USO: Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Il prodotto è indicato solo per uso botanico e agricolo. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta. Si declina ogni responsabilità per uso improprio del prodotto. Si consiglia di effettuare un test su piccole parti della coltura prima di procedere al trattamento esteso.

Le sostanze di base non hanno effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile sull'ambiente. Non sono sostanze potenzialmente pericolose e non possiedono una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici (Reg. CE N. I 107/2009 – art. 23).

STOCCAGGIO

Conservare a temperature comprese tra i 5° e 40°C, in luogo asciutto e fresco, nelle confezioni originali non aperte, evitando la luce solare diretta.