

## SCHEDA TECNICA

## Sprint

### CONCIME PER PRATO E GIARDINO

**Codice articolo:** LI10530**Codice EAN:** 8009985021965**CLASSIFICAZIONE:** CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (S) 13-5-5 (20)**COMPOSIZIONE:** azoto (N) totale 13% di cui azoto (N) organico 2%, azoto (N) ammoniacale 9%, azoto (N) ureico 2%; anidride fosforica ( $P_2O_5$ ) totale 5%, anidride fosforica ( $P_2O_5$ ) solubile in acqua e citrato ammonico neutro 5%, anidride fosforica ( $P_2O_5$ ) solubile in acqua 3%; ossido di potassio ( $K_2O$ ) solubile in acqua 5%; anidride solforica ( $SO_3$ ) solubile in acqua 20%, Carbonio (C) organico di origine biologica 7,5%.**COMPONENTI ORGANICHE:** cuoio e pelli idrolizzate**COMPONENTI MINERALI:** solfato ammonico, urea, fosfato biammonico, perfosfato semplice, solfato potassico**CARATTERISTICHE:** concime studiato per garantire un apporto completo ed equilibrato di nutrimento ai prati, ai campi sportivi e alle principali piante e fiori da giardino. Il giusto equilibrio tra azoto, fosforo e potassio garantisce una buona vegetazione e un irrobustimento radicale accrescendo la resistenza al calpestamento dei prati e il vigore vegetativo delle essenze del giardino. La forma granulare del prodotto consente una distribuzione uniforme degli elementi nutritivi.**FORMULAZIONE:** granulare.**CONFEZIONE:** sacco con maniglia (LDPE-04 – PLASTICA)**PESO NETTO:** 4 kg **USO E DOSI:** distribuire il prodotto uniformemente sul terreno e successivamente innaffiare. Una manciata corrisponde a circa 30-40 g di prodotto.

- *Prato:* distribuire nella dose di 20 g per  $m^2$  (mezza manciata) equivalenti a 2 kg per 100  $m^2$  e a 5 kg per 250  $m^2$ ; trattare in primavera fino a tutto il mese di giugno a intervalli di 20 giorni. Per terreni poveri è raccomandabile ripetere la concimazione anche nel mese di settembre.
- *Giardino:* alberi (magnolia, conifere, ecc.), cespugli (forsizia, oleandro, ecc.), siepi (lauro, ligustro, ecc.), rosai: distribuire nella dose di 40÷80 g (1-2 manciate) per pianta a seconda della dimensione sulla superficie di proiezione della chioma; trattare in primavera a intervalli di 20 giorni; aiuole da fiore: distribuire 40 g per  $m^2$  (circa 1 manciata); trattare dall'inizio della primavera a fine estate a intervalli di 20 giorni.

**EPOCA D'IMPIEGO:**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

In verde: concimare

In bianco: non trattare.

**AVVERTENZE:** le dosi riportate hanno valore indicativo in quanto dipendono dalle condizioni ambientali. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Non ingerire. Le istruzioni sono idonee per l'uso indicato. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.